

## ADDOMINO SCULTURA

L'addominoplastica è l'intervento chirurgico in grado di correggere l'eccesso di pelle e di grasso addominale.

Questo intervento è indicato nei casi in cui l'addome abbia un aspetto "a grembiule" o "pendulo", tipico di chi è ingrassato (eccesso di pelle e grasso), dimagrito drasticamente (eccesso di pelle) o abbia subito gravidanze multiple.

### Tecnica chirurgica:

La pelle ed il grasso della parete addominale vengono scollati e riposizionati inferiormente restituendo all'addome un aspetto teso.

La parete addominale e la sua fascia vengono rinforzati.

L'ombelico viene riposizionato nella sua nuova armonica sede.

Le cicatrici risultano sotto l'elastico degli slip ed intorno al nuovo ombelico.

#### ▪ **Miniaddominoplastica**

Nel casi in cui l'eccesso di pelle e grasso sia modesto.

La quantità di pelle e grasso asportata è minore e quindi non sarà necessario riposizionare l'ombelico, inoltre la cicatrice nascosta dagli slip sarà notevolmente più corta.

#### ▪ **Miniaddominoplastica associata a Liposuzione**

Nei casi in cui il grasso in eccesso si estenda ai fianchi o zone non accessibili convenzionalmente, lo stesso può essere rimosso attraverso apposite canule.

L'intervento viene eseguito in anestesia generale e la degenza prevista è di circa una notte.

#### ▪ **Liposuzione addominale**

Se è presente un eccesso di grasso addominale ma la cute è tonica e non in eccesso è la soluzione ottimale.

È indicata nei casi in cui la quantità di tessuto adiposo sia eccessiva e difficilmente rimovibile tramite metodiche meno invasive (vedi ultrashape).

Cicatrici di soli 2-3 mm nascoste nella piega ombelicale.

Sarà necessario indossare una guaina elastica per 3 settimane.

Questo tipo di intervento può anche essere eseguito in anestesia locale (con o senza sedazione) e non necessita solitamente ricovero.

Esami preliminari: emocromo, formula, VES, glicemia, azotemia, creatininemia, PTT, tempo di protrombina, CPK, elettroliti, colinesterasi, ECG.