

BLEFAROPLASTICA

La blefaroplastica è un intervento chirurgico per eliminare gli eccessi di pelle, ed a volte anche di grasso, delle palpebre che conferiscono agli occhi l'aspetto di uno sguardo stanco e poco sereno e spesso sono il primo segno dell'invecchiamento del volto. Il risultato finale consiste generalmente in un aspetto più riposato, fresco e giovanile.

Le eccessive ore di lavoro ed il processo fisiologico d'invecchiamento rendono i tessuti meno elastici, spesso un eccesso di pelle delle palpebre è causato dalla fuoriuscita del tessuto adiposo che protegge gli occhi dalle sue fasce, è quindi importante non rimuovere il grasso fuori sede bensì riposizionarlo solamente, altrimenti si rischia di creare una mancanza di volume intorno agli occhi.

A seconda della localizzazione del problema è possibile intervenire solo sulle palpebre superiori o su quelle inferiori, a volte è necessario invece eseguire una blefaroplastica completa.

In alcuni casi, a questa procedura, è utile l'associazione di altri trattamenti poiché l'intervento non permette di eliminare le rughe sull'esterno dell'occhio (zampe di gallina), anche se queste possono essere migliorate ed apparire meno evidenti grazie alla distensione della pelle ottenuta. Il trattamento di queste rughe associato a quelle frontali si può eseguire con altri trattamenti quali la tossina botulinica o acido ialuronico. Questo intervento associa la tecnica della blefaroplastica a quella del botulino per rialzare la porzione laterale degli occhi e per spianare le rughe frontali, tra gli occhi.

Il risultato è molto buono fin dall'inizio anche se persiste un'inevitabile gonfiore post-operatorio.

▪ **Blefaroplastica palpebre superiori**

Tecnica chirurgica: viene asportata con un elettrobisturi ad alta precisione "colorado" solamente l'eccesso di cute in eccesso.

Il grasso fuoriuscito ed in alcuni casi anche una piccola porzione di muscolo, che rendono lo sguardo gonfio e pesante, vengono riposizionati e regolati.

L'asportazione di muscolo è limitata solamente a quella porzione non funzionante.

Cicatrici: lineari, sul solco palpebrale.

▪ **Blefaroplastica palpebre inferiori**

Anche nelle palpebre inferiori possiamo avere un eccesso di pelle e grasso e quindi un effetto "gonfio e stanco" degli occhi.

Tecnica chirurgica: la cute in eccesso, il grasso ed i muscoli vengono riposizionati per ridare un aspetto giovanile all'occhio.

Il grasso in eccesso viene riposizionato (e non più rimosso come era d'uso fare anni fa causando un pericoloso effetto "occhio scavato") nella porzione inferiore della palpebra che risulta spesso svuotata.

Cicatrici: ad meno di 1 mm dal margine ciliare inferiore.

▪ **Blefaroplastica + lifting botulinico**

Questo intervento associa la tecnica della blefaroplastica a quella del botulino per rialzare la porzione laterale degli occhi e per spianare le rughe frontali, tra gli occhi.

Non solo elimina le borse e l'eccesso cutaneo dalle palpebre superiori ed inferiori ma solleva la regione anatomica sottopalpebrale dando più risalto alla regione zigomatica.



-
- Esami preliminari: emocromo, formula, VES, glicemia, transaminasi, creatininemia, CPK, PTT, tempo di protrombinemia, ECG.
 - Anestesia: locale, in alcuni casi associata a leggera sedazione (anestesista presente).
 - Degenza: day-hospital.
 - Immediato post-operatorio: la paziente può ritornare a casa accompagnata, minime sono le medicazioni da effettuare e dopo cinque giorni è già possibile rimuovere i punti di sutura. Durante la prima settimana post-operatoria è consigliabile portare gli occhiali da sole per nascondere il gonfiore e le probabili ecchimosi presenti attorno alle palpebre.