

---

## LIPOSUZIONE / LIPOSCULTURA

Trova indicazione nelle adiposità medio/grandi dove le tecniche precedenti non trovano indicazione specifica.

È indicata per gli accumuli di grasso nelle cosce, nei fianchi bassi (culotte de cheval), medi (regione trocanterica) o alti, nell'interno coscia e interno ginocchio, nell'addome e nelle braccia (se la cute è trofica), nei casi in cui la quantità di tessuto adiposo sia eccessiva e difficilmente rimovibile tramite metodiche meno invasive (vedi ultrashape).

Attraverso delle piccole incisioni di 2-3 mm nascoste nelle pieghe o nei solchi cutanei si inseriscono delle microcannule collegate ad un aspiratore.

Il grasso aspirato non ha la capacità di riformarsi ma è necessario controllare l'alimentazione dopo l'intervento per non fare in modo che cellule adipose contigue aumentino di volume.

L'azione chirurgica risulta essere invadente con una anestesia generale e in questi casi occorre un ricovero di una notte.

La convalescenza risulta essere più lunga, fastidiosa ed è necessaria un fasciatura contenitiva per circa due mesi; spesso occorrono dei ritocchi eseguibili anche con le terapie precedenti.

- Esami preliminari: emocromo, formula, VES, glicemia, azotemia, creatinemia, PTT, tempo di protrombina, CPK, elettroliti, colinesterasi, ECG.
- Anestesia: generale ma in alcuni casi anche locale con sedazione.
- Degenza: una notte.